

《緊急時 新規発症等 対応カード》 年 組 (男・女)さん

※ ホットラインは、アレルギー既往のない場合でも対応判断ができない場合に使用することができます。

◆ 救急搬送の受け入れ及びアレルギー症状の判断等に困った場合

<ホットラインへ連絡>

(慈恵医大第三病院)

000-0000-0000

子どもから目を離さず、応援を依頼!

5分以内に判断する

1. 緊急性が高いアレルギー症状はあるか?

全身	<input type="checkbox"/> ぐったり	(:)
	<input type="checkbox"/> 意識もうろう	(:)
	<input type="checkbox"/> 尿や便を漏らす	(:)
	<input type="checkbox"/> 脈がふれにくいまたは不規則	(:)
	<input type="checkbox"/> 唇や爪が青白い	(:)
呼吸器	<input type="checkbox"/> のどや胸が締め付けられる	(:)
	<input type="checkbox"/> 声がかすれる	(:)
	<input type="checkbox"/> 犬が吠えるような咳	(:)
	<input type="checkbox"/> 息がしにくい	(:)
	<input type="checkbox"/> 持続する強い咳き込み	(:)
	<input type="checkbox"/> ゼーゼーする呼吸	(:)
消化器	<input type="checkbox"/> 持続する強い(がまんできない)お腹の痛み	(:)
	<input type="checkbox"/> 繰り返し吐き続ける	(:)

なし

2

へ

1つでもあてはまる場合

① 救急車を要請する(119番通報) (:)

② その場で安静を保つ

(動かさない 仰向け 顔は横向き 足を上げる)

③ その場で救急隊を待つ

応答・呼吸が無い場合 ※救急隊に引き継ぐまで継続する

- ・心臓マッサージ (1分間に100~120回)
- ・AEDの措置



ただちに救急車で医療機関へ搬送(説明できる人が随行)

※症状は急激に変化することがあるため、5分ごとに「1」「2」「3」の症状があるか、注意深く観察する！

2. 下記の症状が1つでもあてはまるか？

なし

- 呼吸器 数回の軽い咳 (:)
- 消化器 中等度のお腹の痛み (:)
- 1~2回のおう吐 (:)
- 1~2回の下痢 (:)
- 目・口・鼻・顔面 顔全体の腫れ (:)
- まぶたの腫れ (:)
- 皮膚 強いかゆみ (:)
- 全身に広がるじんま疹 (:)
- 全身が真っ赤 (:)

3. 下記の症状が1つでもあてはまるか？

- 消化器 軽いお腹の痛み (:) (がまんできる)
- 吐き気 (:)
- 目・口・鼻・顔面 目のかゆみ、充血 (:)
- 口の中の違和感 (:)
- 唇の腫れ (:)
- くしゃみ・鼻水・鼻づまり (:)
- 皮膚 軽度のかゆみ (:)
- 数個のじんま疹 (:)
- 部分的な赤み (:)

1つでもあてはまる場合

1つでもあてはまる場合

- ① 速やかに医療機関を受診する (救急車の要請も考慮) 医療機関に到着するまで、5分ごとに症状の変化を観察する。
- ② 容態が進行し、「1」の症状にあてはまる場合は、それにあわせた対応をする。

速やかに医療機関を受診

- ① 少なくとも5分ごとに症状の変化を観察。一時間程度経過し、症状の改善がみられない場合は医療機関を受診する。
- ② 容態が進行し、「1」または「2」の症状にあてはまる場合は、それにあわせた対応をする。

安静にし、注意深く経過観察

	ぐったり、意識もうろうの場合	吐き気、おう吐がある場合	呼吸が苦しく仰向けになれない場合
安静を保つ体位			
	血圧が低下しているおそれがあるため、仰向けで足を15~30cm高くする。	おう吐物による窒息を防ぐため、体と顔を横における。	呼吸を楽にするため、上半身を少し起こし、後ろに寄りかからせる。